

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht

Ansprechpartner

Telefon, E-Mail

Datum

14.11.2023

### Informationen zum C13-Atemtest zur Diagnostik im Rahmen einer Infektion mit *Helicobacter pylori*

Sehr geehrtes Praxisteam,

zur Erfolgskontrolle einer Eradikationstherapie einer H.pylori Infektion kann der C13-Atemtest oder der H. pylori Antigen-Stuhltest eingesetzt werden.

Beim C13-Atemtest wird nach oraler Aufnahme einer 50 mg C13-Harnstoff-Tablette (z.B. Diabact®-UBT) der Anteil von C13-Kohlendioxid gemessen. Alternativ ist auch eine 75 mg C13-Harnstoff-Kapsel möglich, die zurzeit praktisch nicht verfügbar ist.

Wenn Sie bei Ihren Patienten den C13-Atemtest durchführen möchten, können Sie entweder

- eine 50 mg C13-Harnstoff-Tablette über Ihre Apotheke bestellen (z.B. Diabact®-UBT, PZN: 05509783) und den Test selbst in der Praxis durchführen (der Atembeutel kann weiterhin zu uns eingesandt werden)

oder

- den Test im Labor durchführen lassen (mit Überweisung).

Das benötigte Material für die Durchführung in der Praxis (Atembeutel, Strohhalm) können Sie wie gewohnt bei uns bestellen, Tel.: 0431 220 10 200.

Der H. pylori Antigen-Stuhltest hat eine vergleichbare Sensitivität und Spezifität bei der Erfolgskontrolle nach Eradikationstherapie.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. med. Meno Rodewald

Dr. med. Thomas Lorentz